

Rozdział VIII

OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ KACZEK

TABELE:

Wyniki oceny wartości użytkowej kaczek

- 66 Stada rodzicielskie kaczek – wychów, stada kaczek typu pekin.
- 67 Liczba stad rodzicielskich kaczek w poszczególnych województwach – wychów.
- 68 Stada rodzicielskie kaczek typu pekin – produkcja, stada w pierwszym i drugim sezonie.
- 69 Stada rodzicielskie kaczek typu pekin – produkcja, stada w pierwszym sezonie.
- 70 Stada rodzicielskie kaczek typu pekin – produkcja, stada w drugim sezonie.
- 71 Liczba stad rodzicielskich kaczek w poszczególnych województwach – produkcja.
- 72 Stada brojlerów kaczych – kaczki typu pekin, kaczki piżmowe.

WYKRESY:

- 28 Stada rodzicielskie kaczek typu pekin – produkcja, stada w pierwszym sezonie, zestawienie według liczby jaj wylęgowych od nioski stanu początkowego i średniej liczby dni produkcji nieśnej.
- 29 Stada rodzicielskie kaczek typu pekin – produkcja, stada w drugim sezonie, zestawienie według liczby jaj wylęgowych od nioski stanu początkowego i średniej liczby dni produkcji nieśnej.

KARTODIAGRAMY:

- 17 Stada rodzicielskie kaczek typu pekin – padnięcia i brakowania zdrowotne w okresie wychowu.
- 18 Stada rodzicielskie kaczek typu pekin – padnięcia i brakowania zdrowotne w okresie produkcji.

Tabela 66

Ocena wartości użytkowej **kaczek** w 2020 r.*
STADA RODZICIELSKIE
WYCHÓW KACZEK TYPU PEKIN


Zestaw hodowlany	Liczba stad	Średnia liczba piskląt przyjętych do wychowu (szt.)		do 7. dnia życia		Padnięcia do końca wychowu (%)		Brakowania zdrowotne do końca wychowu (%)		Inne ubytki (%)		Zużycie paszy treściwej na szt. średnią (kg)
		♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	
SM3 HEAVY	11	643	3 099	0,8	0,7	4,1	3,8	0,6	0,1	0,8	0,0	brak danych
GL-50 X GL-30	8	1 351	6 164	0,7	0,4	2,5	1,9	2,5	1,2	0,8	0,5	25,7
SM3 HEAVY	7	738	3 690	0,8	0,7	2,4	2,1	1,3	2,0	0,0	0,1	21,9
SM3 MEDIUM	7	475	2 377	1,5	1,8	5,1	3,6	1,2	0,8	0,0	0,0	24,1
ST5 HEAVY	4	506	2 527	1,7	1,7	4,4	3,5	0,6	0,3	0,0	0,0	25,7
ST 5 SUPER HEAVY	1	915	2 496	2,1	2,1	7,1	3,4	1,1	1,4	39,9	0,0	25,7
OGÓŁEM/ŚREDNIA	38	771	3 644	1,0	1,0	3,8	3,0	1,2	0,9	1,5	0,1	23,5

* dotyczy stad, których wychów został zakończony w 2020 r.



Ocena wartości użytkowej **kaczek** w 2020 r.*


**LICZBA STAD RODZICIELSKICH
W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH
WYCHÓW**

Województwo	Liczba stad	Liczba piskląt przyjętych do wychowu (szt.)	
		♂♂	♀♀
wielkopolskie	15	14 818	69 007
lubelskie	7	2 185	9 959
łódzkie	7	3 809	19 054
warmińsko-mazurskie	3	2 560	12 248
kujawsko-pomorskie	2	420	2 100
dolnośląskie	2	3 704	17 325
zachodniopomorskie	1	1 180	5 610
mazowieckie	1	633	3 162
OGÓŁEM	38	29 309	138 465

* dotyczy stad, których wychów został zakończony w 2020 r.

STADA RODZICIELSKIE

Padnięcia i brakowania zdrowotne samic kaczek – okres wychowu



Zakres procentowego udziału samic

1,50 - 2,30

4,10

7,20 - 8,80

12,50 - 13,80

49,80

■ średni procent padnięć

■ średni procent brakowań zdrowotnych

Ocena wartości użytkowej kaczek w 2020 r.*

STADA RODZICIELSKIE
PRODUKCJA KACZEK TYPU PEKIN***


Zestaw hodowlany	Liczba stad	Średni stan początkowy (szt.)		Padnięcia (%)		Brakowania zdrowotne (%)		Inne ubytki (%)		Liczba jaj od niosek PL** wylęgowych nalożonych do wylęgu (szt.)		Nieśność (%)	Zapłodnienie jaj (%)	Wyląg piskląt z jaj nalożonych (%)	Średnia liczba dni produkcji niesnej	Zużycie paszy treściwej na szt. średnią (kg)
		♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀					
GL-50 X GL-30	13	764	3 615	3,9	4,7	2,0	2,5	1,5	0,4	210,6	210,2	65,2	91,0	70,1	330	77,5
SM3 HEAVY	12	547	2 724	7,4	10,5	5,4	4,3	1,8	1,3	220,5	202,1	72,0	95,1	75,4	334	77,1
ST5 HEAVY	7	375	1 897	8,7	6,6	3,7	1,3	0,0	1,6	212,7	212,0	68,5	87,7	70,1	328	73,2
ST5 SUPER HEAVY	3	823	4 210	10,2	9,1	7,0	3,2	0,0	0,0	198,2	198,2	73,4	91,9	72,9	278	80,2
A-55 X F-11	2	45	227	6,6	2,9	0,0	0,8	0,0	0,0	62,9	66,1	88,8	74,4	63,8	149	brak danych
SM3 MEDIUM	1	700	3 500	4,3	11,4	1,4	2,9	0,0	0,0	175,5	175,5	53,0	96,0	70,0	473	brak danych
OGÓŁEM/ŚREDNIA	38	589	2 883	6,6	7,3	3,7	2,8	1,1	0,8	207,7	197,4	69,3	90,3	71,7	321	77,2

* dotyczy stad, które zakorczyły produkcję w 2020 r.

** PL – początkowa liczba niosek

*** dotyczy stad w pierwszym i drugim sezonie produkcji

Tabela 69



Ocena wartości użytkowej kaczek w 2020 r.*

STADA RODZICIELSKIE
PRODUKCJA KACZEK TYPU PEKIN
PIERWSZY SEZON




Zestaw hodowlany	Liczba stad	Średni stan początkowy (szt.)		Padnięcia (%)		Brakowania zdrowotne (%)		Inne ubytki (%)		Liczba jaj od niosek PL** wyługowych nałożonych do wyługu (szt.)		Nieśność (%)	Zapłodnienie jaj (%)	Wyląg piskląt z jaj nałożonych (%)	Średnia liczba dni produkcji nieśnej	Zużycie paszy treściwej na szt. średnią (kg)
		♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀							
GL-50 x GL-30	11	746	3 581	4,3	5,0	2,1	2,3	1,8	0,5	220,3	220,0	61,8	90,1	70,9	335	89,0
SM3 HEAVY	9	486	2 474	7,0	9,3	5,5	4,3	1,9	1,2	247,8	222,9	70,1	97,2	74,8	365	81,3
ST5 HEAVY	6	405	2 050	9,3	7,0	3,9	1,3	0,0	1,9	227,7	227,0	70,1	86,9	69,8	338	76,1
ST5 SUPER HEAVY	2	841	4 340	11,0	6,5	4,7	1,7	0,0	0,0	231,3	231,3	80,9	91,9	72,8	299	81,2
SM3 MEDIUM	1	700	3 500	4,3	11,4	1,4	2,9	0,0	0,0	175,5	175,5	53,0	96,0	70,0	473	brak danych
OGÓŁEM/ŚREDNIA	29	600	2 970	6,6	7,0	3,7	2,7	1,3	0,9	230,0	221,7	67,6	90,4	72,0	347	84,2

* dotyczy stad, które zakończyły produkcję w 2020 r.

** PL – początkowa liczba niosek

Ocena wartości użytkowej **kaczek** w 2020 r.*

**STADA RODZICIELSKIE
KACZKI TYPU PEKIN
PIERWSZY SEZON**



* dotyczy stad, które zakończyły produkcję w 2020 r.



Tabela 70

Ocena wartości użytkowej **kaczek** w 2020 r.*

STADA RODZICIELSKIE
PRODUKCJA KACZEK TYPU PEKIN
DRUGI SEZON




Zestaw hodowlany	Liczba stad	Średni stan początkowy (szt.)		Padnięcia (%)		Brakowania zdrowotne (%)		Inne ubytki (%)		Liczba jaj od niosek PL** wylęgowych		Nieśność (%)	Zapłodnienie jaj (%)	Wyląg piskląt z jaj nałożonych (%)	Średnia liczba dni produkcji niesnej	Zużycie paszy treściwej na szt. średnią (kg)
		♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	(szt.)	(szt.)					
SM3 HEAVY	3	729	3 474	8,7	14,3	5,1	4,1	1,5	1,5	147,7	146,8	77,1	93,1	76,9	243	47,5
GL-50 x GL-30	2	862	3 797	2,0	3,1	1,4	3,3	0,0	0,0	171,8	170,8	78,8	93,5	67,0	304	42,9
A-55 x F-11	2	45	227	6,6	2,9	0,0	0,8	0,0	0,0	66,1	62,9	88,8	74,4	63,8	149	brak danych
ST5 SUPER HEAVY	1	788	3 950	8,5	14,4	11,8	6,2	0,0	0,0	132,0	132,0	58,6	brak danych	73,1	237	47,4
ST5 HEAVY	1	195	980	5,1	4,1	2,6	1,0	0,0	0,0	123,0	121,8	59,1	92,8	71,4	269	49,2
OGÓŁEM/ŚREDNIA	9	554	2 600	6,3	8,1	3,9	2,9	0,5	0,5	138,1	129,8	74,4	90,1	70,8	238	46,0

* dotyczy stad, które zakończyły produkcję w 2020 r.

** PL – początkowa liczba niosek

Ocena wartości użytkowej kaczek w 2020 r.*


STADA RODZICIELSKIE
KACZKI TYPU PEKIN
DRUGI SEZON



* dotyczy stad, które zakończyły produkcję w 2020 r.

STADA RODZICIELSKIE

Padnięcia i brakowania zdrowotne samic kaczek typu pekin – okres produkcji



Zakres procentowego udziału samic

0,10 - 0,40

1,50 - 1,80

3,10 - 3,70

7,60 - 9,80

72,00

■ średni procent padnięć

■ średni procent brakowań zdrowotnych



Ocena wartości użytkowej **kaczek** w 2020 r.*

LICZBA STAD RODZICIELSKICH W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH PRODUKCJA

Województwo	Liczba stad	Łączna liczba piskląt przyjętych do wychowu (szt.)	
		♂♂	♀♀
wielkopolskie	16	15 960	78 888
warmińsko-mazurskie	6	2 322	10 752
lubelskie	6	1 747	8 292
łódzkie	3	853	4 079
kujawsko-pomorskie	2	336	1 691
mazowieckie	2	691	3 440
śląskie	1	74	388
zachodniopomorskie	1	380	1 946
pomorskie	1	16	65
OGÓŁEM/ŚREDNIA	38	22 379	109 541

* stada, które zakończyły produkcję w 2020 r.

Ocena wartości użytkowej **kaczek** w 2020 r.***STADA BROJLERÓW KACZYCH**

Zestaw hodowlany	Liczba stad	Średnia liczba piskląt przyjętych do odchovu	Padnięcie (%)		Średnia masa ciała (kg)	Zużycie paszy treściwej na kg przyrostu masy ciała (kg)	Średnia liczba dni odchovu	Średni przyrost dzienny (g/dzień)	Europejski Wskaźnik Wydajności **
			do 3. dnia	do 7. dnia życia					

KACZKI TYPU PEKIN

odchów łączny (samce i samice)										
ST5 HEAVY	43	7 379	0,5	1,4	4,2	3,45	2,47	45	76,8	298,1
STAR 53 H.Y.	42	7 774	0,6	1,8	5,8	3,27	2,41	44	75,1	293,2
SM3 HEAVY	34	6 349	0,6	1,8	5,2	3,55	2,54	46	77,1	287,8
OGÓŁEM/ŚREDNIA	119	7 224	0,6	1,7	5,0	3,42	2,47	45	76,3	293,5

KACZKI PIŻMOWE

odchów łączny (samce i samice)										
kaczka piżmowa	22	4 250	0,6	2,3	6,0	3,57	2,77	78	45,1	152,4

* dane dotyczą stad, których odchów został zakończony w 2020 r.

** Europejski Wskaźnik Wydajności = $\frac{\text{przeżywalność (\%)} \times \text{masa ciała (kg)}}{\text{liczba dni odchovu} \times \text{zużycie paszy na 1 kg masy ciała (kg)}} \times 100$